

SINALGEX

Comprimidos recubiertos

ANTINFLAMATORIO ANALGESICO ANTIPIRETICO

COMPOSICION:

Diclofenac potásico..... 50 mg;
Paracetamol..... 300 mg;
Excipientes c.s.p.1 comprimido recubierto.


PROPIEDADES:

SINALGEX es un antiinflamatorio, anti-reumático, analgésico y antipirético que actúa rápidamente remitiendo el dolor y el edema de la inflamación, sea aguda o crónica, cualquiera sea su intensidad y localización;

SINALGEX contiene en su formulación al **Diclofenac potásico**, antiinflamatorio no esteroideo inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas por la vía de la ciclo-oxigenasa, con marcada acción antiinflamatoria, analgésica y moderado efecto antipirético, el Diclofenac se absorbe rápidamente luego de su administración por vía oral, su concentración llega a su pico máximo entre 15 y 60 min luego de la ingesta, con los alimentos se entorpece la absorción sin variar la cantidad absorbida. En el plasma se une a las albúminas en un 90%. El 60 % se elimina por orina en forma de metabolitos, el resto se elimina por la bilis y por las heces. En combinación con el **Paracetamol**, derivado paraaminofenol que potencializa la acción analgésica y antipirética del Diclofenac, asociación bien tolerada en general. El Paracetamol es recomendado por la OMS por su alto rango de tolerancia, produce una sensación de bienestar y brinda una ligera acción protectora de la mucosa gástrica por no tener acción anti-prostaglandinica. Se absorbe rápida y totalmente a nivel gastrointestinal, alcanzando su pico máximo en la sangre entre 30 y 60 min, su vida media es de 2 horas. Se une a las proteínas de la sangre en forma variable. Se metaboliza en el hígado, conjugándose en su mayor parte, con el ácido glucurónico, con el ácido sulfúrico y con la cisteína.

INDICACIONES:

- Reumatismos inflamatorios:** Artritis reumatoidea, Espondilitis anquilosante, Artritis psoriásica, Gota y Pseudogota.
- Enfermedades degenerativas de las articulaciones y de la columna vertebral:** Artrosis, discopatías.
- Inflamaciones extra-articulares:** Lumbo-ciatalgia (Lumbago), Neuralgias cervico-braquiales, Periartritis de hombro, Tendinitis, Bursitis, Epicondilitis.



Durazno 1615 c/ Paz del Chaco - Tel./Fax: 021 300122- Lambaré, Paraguay
email: meditec@meditec.com.py - www.meditec.com.py

MEDITEC
División de EMEPAR S.R.L.

-**Traumatología:** Politraumatismos, Fracturas, Esguinces, Luxaciones, Post-cirugía.

-**Ginecología:** Dismenorreas, Post-cirugía.

-**Urología:** Litiasis reno-ureterales, Polaquiuria, Post-cirugía.

-**Otorrinolaringología:** Sinusitis, Otitis, Faringitis, Amigdalitis, Post-cirugía.

-**Procesos infecciosos en general en asociación con antibióticos.**

-**Síndromes inflamatorios y dolorosos de los dientes.**

CONTRAINDICACIONES:

Úlcera péptica en actividad.

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Usar con precaución en pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas, Insuficiencia cardíaca, hepática o renal graves y embarazo.

Al igual que otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, esta contraindicado en pacientes a quienes el ácido acetil salicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandinas sintetasas hayan desencadenado ataque de asma, urticarias o rinitis aguda.

Se desaconseja su uso durante el embarazo y la lactancia

EFFECTOS COLATERALES:

SINALGEX es bien tolerado en general, pero ocasionalmente puede producir molestias gastro-intestinales, edema periférico y reacciones cutáneas que desaparecen al suspender la medicación

INTERACCIONES:

El Diclofenac puede elevar el nivel plasmático del litio, la digoxina y del Metotrexato. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. Riesgo de hemorragia con el empleo conjunto con anticoagulantes. Aumenta la nefrotoxicidad de la Ciclosporina.

Eventualmente el uso del Diclofenac con hipoglucemiantes orales puede producir hipoglucemia

No se recomienda el uso concomitante de Paracetamol y salicilatos por el riesgo de desarrollar una nefropatía analgésica, incluyendo necrosis papilar y enfermedad renal terminal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Antecedentes de enfermedad gastrointestinal, insuficiencia hepática, cardíaca o renal. Pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes.

Edad avanzada.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

1 comprimido 2 o 3 veces por día, de preferencia después de las comidas.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):

No existe una manifestación específica en casos de sobredosis. Si ello ocurriera consulte a su médico o recurra al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas: Avda. General Santos y Teodoro S. Mongelós Teléfono: 021 220 418.

PRESENTACIÓN:

Caja con 12 comprimidos recubiertos

**CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO A UNA TEMPERATURA
DE 15° A 30°C**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VENTA BAJO RECETA

Elaborado por Lab. INDUFAR C.I.S.A. - Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista,
Fndo. de la Mora - Paraguay. Reg. Dr. Humberto Simón – Reg. Nro. 535
para MEDITEC, división de EMEPAR S.R.L.
Regente: Quím. Farm. Cesar Paredes - Reg. Prof. N° 4.055