

migra SINALGEX

Comprimidos recubiertos

CONTRA LA JAQUECA Y TODO TIPO DE CEFALEAS

COMPOSICION:

Paracetamol.....	500 mg;
Doxilamina succinato.....	10 mg;
Cafeina anhidra.....	50 mg;
Tartrato de ergotamina.....	1 mg;
Excipientes c.s.p.1 comprimido recubierto.	

PROPIEDADES:

La fórmula del **migra SINALGEX** está destinada a combatir a fondo los trastornos fisiopatológicos de las diferentes formas de cefaleas, en especial las de tipo vascular.

migra SINALGEX combina:

El **Paracetamol**, un derivado paraaminofenol. Potente analgésico, sobre todo en las cefaleas. Recomendado por la OMS por su alto rango de tolerancia además de producir una sensación de bienestar y brindar una ligera acción protectora de la mucosa gástrica por no tener acción anti-prostaglandínica.

El **Tartrato de Ergotamina** es un derivado del cornezuelo de centeno, con acción vasotónica específica sobre las arterias del cráneo que se encuentran distendidas. Actúa en forma sinérgica con la **Cafeína** que acelera y aumenta su absorción entérica, previniendo y combatiendo la vasodilatación cerebral.

El **Succinato de Doxilamina**, con su doble acción antihistamínica bloqueadora H₁ y ansiolítica, inhibe por una parte los efectos vasoconstrictores de la histamina en la etapa inicial de la jaqueca y por otra parte combate la ansiedad que generalmente desencadena o acompaña a las cefaleas vasculares o tensionales.

INDICACIONES:

- Cefaleas vasculares: Migraña clásica (Jaqueca);
Migraña común,
Migraña oftalmoplejica;
Cefalea de Horton.
- Cefaleas tensionales.
- Cefaleas post-ingestión de alcohol (Resaca)



Durazno 1615 c/ Paz del Chaco - Tel./Fax: 021 300122- Lambaré, Paraguay
email: meditec@meditec.com.py - www.meditec.com.py

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.
- Embarazo. Lactancia.
- La Ergotamina está contraindicada en enfermedades vasculares Obliterantes: Insuficiencia coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad de Raynaud.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Insuficiencia hepatocelular por la presencia del Paracetamol.
- Insuficiencia renal. Sepsis. Hipertiroidismo. Porfiria.
- Glaucoma de ángulo cerrado.

REACCIONES, ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES:

- Parestesias, frialdad de manos y pies, trastornos de la circulación periférica, sobre todo arterial.
- Trastornos digestivos en personas sensibles.
- Somnolencia, sedación.
- Pueden observarse, aunque raramente: sequedad bucal y trastornos visuales.
- Pueden producir retención urinaria en pacientes con problemas uretroprostáticos por contener antihistamínico

RESTRICCIONES DE USO:

- Conductores y operadores de maquinarias porque puede producir somnolencia.
- Utilizar con cuidado en pacientes con asma o insuficiencia hepática.
- No se recomienda en menores de 10 años

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

1 comprimidos al inicio de la crisis o en el estado prodrómico. En caso necesario 1 comprimido luego de 30 a 60 minutos. Continuar con 1 comprimido cada 6 horas. No sobrepasar 4 comprimidos por día o 12 comprimidos por semana por el riesgo de ergotismo.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:

- No utilizar conjuntamente con otros fármacos que deprimen el sistema nervioso central como ser: tranquilizantes, barbitúricos o alcohol
- La ergotamina no debe asociarse con Macrólidos, Betabloqueantes y otros agentes vasoconstrictores porque aumentan los efectos isquémicos.

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):

Luego de una sobredosis, se pueden producir en forma aguda síntomas gastrointestinales tales como náuseas, vómitos y diarrea, sed intensa, dolor y cianosis de las extremidades, alteración de la presión arterial, debilidad, alteración de la conciencia. Tras la evaluación clínica el profesional evaluará si debe recurrir a la inducción al vómito o llevar a cabo el lavado gástrico luego de la administración de carbón activado o un laxante activo por osmosis (sulfato de sodio). Deberá mantenerse el equilibrio de líquidos y de electrolitos.

En caso de sobredosis consulte a su medico o recurra al Centro Nacional de Toxicología del Centro Emergencias Médicas: Avda. General Santos y Teodoro S. Mongelós Teléfono: 021 220 418.

PRESENTACIÓN:

- Caja con 12 comprimidos recubiertos
- Sobres con 4 comprimidos recubiertos.

**CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO A UNA TEMPERATURA
DE 15° A 30°C
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA**

Elaborado por Lab. INDUFAR C.I.S.A. - Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista,
Fndo. de la Mora - Paraguay. Reg. Dr. Humberto Simón – Reg. Nro. 535
para MEDITEC, división de EMEPAR S.R.L.
Regente: Quím. Farm. Cesar Paredes - Reg. Prof. N° 4.055